

**SI TIENE PREGUNTAS,  
CONSULTE A SU MÉDICO.**

**¿CUÁNDO LLAMAR A SU PEDIATRA?**

Llame de inmediato al pediatra si su bebé o niño(a):

- Tiene dificultad para respirar
- Es menor de 2 o 3 meses de edad y tiene fiebre
- Muestra señales de deshidratación (como boca seca, llanto sin lágrimas y disminución en la cantidad de orina)



**VIRUS  
RESPIRATORIO  
SINCITAL**

**Referencias:**  
[www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/chest-lungs](http://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/chest-lungs)

---

**Manatí Medical Center**  
Calle Hernández Carrión, Urb. Atenas  
Manatí, Puerto Rico  
Programa Educación a Paciente y Familia  
abril 2018

La información que se provee en este folleto es solo con fines educativos. Es importante que siempre consulte a su médico sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.

## ¿QUÉ ES EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL?

El Virus Respiratorio Sincital (RSV, por sus siglas en inglés) es la causa más común de infecciones del sistema respiratorio (afecta pulmones y las vías respiratorias) en niños menores de un año. Es el responsable de la bronquiolitis, asma, pulmonía y es causante de muchas hospitalizaciones en los bebés a partir de los dos meses hasta los ocho meses de edad.

Se transmite de un niño infectado por las secreciones de la nariz o la boca por el contacto directo o gotitas en el aire. Es altamente contagiosa que ocurre más a menudo durante los meses de otoño y primavera.

### SÍNTOMAS:

Muchos niños con infecciones por RSV tienen solo síntomas leves, parecidos a los síntomas de un resfriado común. En los niños menores de 2 años de edad, la infección puede progresar a los síntomas de bronquiolitis.

- Congestión y goteo nasal
- Tos
- Fiebre
- Dificultad para respirar

### DIAGNÓSTICO:

El pediatra puede ordenar pruebas de sangre, muestras tomadas de la nariz y garganta de su hijo para identificar el virus.

### TRATAMIENTO:

- Broncodilatador para ayudar a abrir las vías respiratorias
- Líquidos por vena
- Oxígeno

### PREVENCIÓN:

- Lavado de manos con agua y jabón.
- Reduzca el contacto con familiares que tienen goteos nasales u otras enfermedades.
- limite el tiempo que los hermanos pasan con su bebé cuando están resfriados
- Mantenga a su bebé alejado de centros comerciales y ascensores o donde pueda tener contacto cercano con gente que pueda estar enferma.
- Evite fumar cerca de su bebé

